

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В МОСКВЕ

Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь

Паллиативная помощь призвана повышать качество жизни пациента на последнем этапе неизлечимой болезни и оказывать поддержку его близким.

В государственных учреждениях паллиативная помощь оказывается БЕСПЛАТНО:

амбулаторно, в том числе на дому: в каждом районе есть выездные патронажные службы, а в отдельных поликлиниках — кабинеты паллиативной помощи;

стационарно: в Центре паллиативной помощи и его 8 окружных филиалах-хосписах, а также в паллиативных отделениях при некоторых больницах.

8 800 700-84-36

Горячая линия помощи неизлечимо больным людям
(бесплатно, круглосуточно)

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Проект «Всероссийская круглосуточная горячая линия по вопросам оказания паллиативной помощи».



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Шаг 1

Ваш лечащий врач или созданная им врачебная комиссия принимают решение о том, нуждаетесь ли вы в паллиативной помощи.

Если вам показана паллиативная помощь:

Шаг 2

Лечащий врач поможет понять, как вам правильнее продолжить лечение - в стационаре или на дому; посоветует, в какое учреждение паллиативной помощи обратиться; подскажет, что нужно, чтобы встать на учет. В Москве есть кабинеты паллиативной помощи при поликлиниках, специализированные отделения при больницах, Центр паллиативной помощи и его 8 филиалов-хосписов.

Шаг 3

Позвоните в диспетчерскую службу Центра паллиативной помощи

8 (499) 940-19-48

Шаг 4

Если вы не получили необходимую информацию или хотите узнать больше, позвоните по телефону горячей линии помощи неизлечимо больным людям.

8 800 700-84-36 круглосуточно
бесплатно

Узнайте:


- что такое паллиативная помощь;
- где и как получить паллиативную помощь стационарно;
- где и как получить паллиативную помощь на дому;
- что такое Центр паллиативной помощи;
- почему хоспис - это не страшно;
- кто может выписать рецепт на обезболивающие;
- что делать, если обезболивающие не выписывают;
- что делать, если обезболивающие не помогают;
- где получить психологическую поддержку.

БОЛЬ НУЖНО ЛЕЧИТЬ И МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

Только пациент знает все о своей боли

Оценить уровень боли можно самостоятельно по шкале:

ШКАЛА БОЛИ



СЛАБАЯ БОЛЬ 0-4

Ночной сон не нарушен из-за боли.
Обычные анальгетики хорошо снимают боль на 4-6 часов.

УМЕРЕННАЯ БОЛЬ 4-7

Ночной сон нарушен приступами боли.
Обычные анальгетики малозэффективны, действуют не более 1-3 часов.

СИЛЬНАЯ И НЕСТЕРПИМАЯ БОЛЬ 7-10

Практически невозможно спать из-за сильной боли.
Никакие ранее назначенные средства не помогают или помогают на 3-4 часа.

НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ!

Даже при тяжелом заболевании можно жить без боли.

Боль нужно лечить, не дожидаясь, пока она выйдет из «зеленой» зоны (слабая боль) в «желтую» (умеренная боль) и тем более в «красную» (невыносимая боль).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Шаг 1

Информируйте лечащего врача о боли согласно оценке по шкале. Врач скорректирует схему лечения и, возможно, назначит новые препараты. Рецепт на получение обезболивающих препаратов можно получить в районной поликлинике или в Центре паллиативной помощи.

Шаг 2

Строго следуйте назначениям врача.

Анальгетикам требуется время, чтобы снять болевой приступ или хроническую боль, поэтому принимать обезболивающие препараты нужно регулярно по часам (даже если еще не болит). Предотвратить усиление боли и возникновение болевых приступов можно, только принимая обезболивающие препараты **заблаговременно**, строго по схеме, определенной врачом.

Шаг 3

Попросите врача расписать вам схему приема препаратов в понятной для вас форме.

Убедитесь, что в данной схеме содержится следующая информация:

Пример:

Действие препарата	обезболивание
Название препарата	Кетонал
Форма выпуска	капсула
Путь введения	через рот
Кратность приема в сутки	2 раза в сутки
Часы приема	8:00 и 20:00

Шаг 4

Контролируйте возникновение побочных действий обезболивающих препаратов (сонливость, тошнота и рвота, запоры). Информируйте лечащего врача об их появлении. Все побочные эффекты можно и нужно лечить. Назначение слабительных препаратов при приеме опиоидных анальгетиков обязательно! Не стесняйтесь задавать вопросы врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не повышайте самостоятельно дозу обезболивающего препарата, назначенную врачом. Передозировка лекарств может вызвать нарушение дыхания.

Нельзя резко прекращать прием обезболивающих, это может привести к ухудшению общего самочувствия. Врач поможет вам постепенно снизить дозу препарата, чтобы избежать неприятных симптомов.

Употребление алкоголя на фоне приема обезболивающих препаратов может вызвать осложнения.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать вместе с анальгетиками препараты, обладающие снотворным действием.

Обезболивающие препараты необходимо хранить в местах, недоступных для детей. Нельзя также допускать передачу лекарств другим людям.

При сильной боли, не поддающейся лечению имеющимися у вас лекарствами, вызывайте скорую помощь (112), которая имеет право обезболить пациента, в том числе с применением наркотических анальгетиков*.

112..... 

* Подпункт «б» пункта 13 Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ

Если у вас возникли трудности при назначении обезболивающего, получении паллиативной помощи или вы недовольны ее качеством:

Шаг 1

Обратитесь к главному врачу/заведующему хосписа/больницы или поликлиники с письменной жалобой и получите письменное заключение (в том числе в случае отказа).

Шаг 2

Если проблема не решилась, то обращайтесь к специалистам:

Горячая линия Департамента здравоохранения города Москвы
8 (499) 251-83-00

Горячая линия Росздравнадзора (по вопросам обезболивания)
8 800 500-18-35

Горячая линия Минздрава РФ
8 800 200-03-89

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи города Москвы
8 (499) 940-19-50, доб. 206

Горячая линия центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы
8 (495) 974-63-65

Шаг 3

Если вы не можете получить помощь, звоните на горячую линию помощи неизлечимо больным людям

8 800 700-84-36